

# Internationaler Prostata-Symptomen-Score (IPSS)

Markieren Sie bei jeder Frage, die für Sie am besten zutreffende Antwort.

## IPSS

	niemals	seltener als in 1 von 5 Fällen	seltener als in der Hälfte aller Fälle	ungefähr in der Hälfte aller Fälle	in mehr als der Hälfte aller Fälle	fast immer	
1. Wie oft während des letzten Monats hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Blase nach dem Wasserlassen nicht ganz entleert war?	0	1	2	3	4	5	
2. Wie oft während des letzten Monats mussten Sie nach weniger als 2 Stunden ein zweites Mal Wasserlassen?	0	1	2	3	4	5	
3. Wie oft während des letzten Monats mussten Sie beim Wasserlassen mehrmals aufhören und wieder neu beginnen?	0	1	2	3	4	5	
4. Wie oft während des letzten Monats hatten Sie Schwierigkeiten, das Wasserlassen hinauszuzögern?	0	1	2	3	4	5	
5. Wie oft hatten Sie einen schwachen Strahl beim Wasserlassen?	0	1	2	3	4	5	
6. Wie oft während des letzten Monats mussten Sie pressen oder sich anstrengen, um mit dem Wasserlassen aufzuhören?	0	1	2	3	4	5	
7. Wie oft sind Sie während des Monats normalerweise nachts aufgestanden um Wasser zu lassen? Maßgeblich ist die Zeit vom Zubettgehen bis zum Aufstehen morgens?	0	1	2	3	4	5	
Nur vom Arzt auszufüllen			Summe	IPSS-Score	S:		

Ergebnis:

IPPS 0 – 7:

Milde oder gar keine Symptome.

IPPS 8 – 19:

Mittelgradige Symptome

IPPS 20 bis 35:

Schwere Symptome